



Du er Patient Temperatur Manageren

Patient Temperatur Vejlednings Guide*


1h Pre-operativ fase



Per (intra)-operativ fase



24h Post-operativ fase




*Denne vejledning er baseret på internationale vejledninger fra S3 (Tyskland), NICE (UK), og ASPAN (USA). Vi anbefaler brug af denne vejledning eller handling i overensstemmelse med jeres interne protokol.

Perioperativ Pathway

Nøgle faktorer



Sørg for altid at behandle dine patienter for at sikre en kerntemperatur over 36° C



Forvarm og informer (om PTM) alle dine patienter



Monitorer hver patients temperatur hvert 15. minut



Anvend Patient Temperatur Behandling (PTM) når anæstesen varer mere end 30 minutte




Varm altid væsken når den indgivne volumen er over 500 ml

Guiden er tiltænkt alle patienter undtagen:

- Børn og unge mennesker under 18 år
- Gravide kvinder
- Patienter som er blevet behandlet med terapeutisk hypotermi
- Patienter under operative indgreb under lokal anæstesi
- Patienter med svære hovedskader resulterer i nedsat temperaturkontrol

Varme komfort skala

Føler patienten sig komfortabel varm? Spørg dem venligst om at bedømme deres komfort:



**ANSI/ASHRAE Standard 55